


Beckenfrakturen



Beckenfrakturen



prae op



post op

Beckenfrakturen

Becken – Mehrfragment - Frakturen



prae op



post op



HD Röntgen



DSH, 14 Mo.
HD frei



DSH, 1J.
Übergangsform



Münsterl. 8 Mo.
Hochgradig HD



Bernhardiner
Hochgradig HD
Coxarthrose

Operatives Management

- Goldimplantate
- Pektinektomie
- Neurektomie
- Femurkopfhalsresektion
- Dreifache Beckenosteotomie
- Intertrochantäre Varisationsosteotomie
- Femurhals-Verlängerungsosteotomie
- Totalendoprothese
- Symphysiodesis




Bordeaux Dogge, mk, 3 J.
HD und KBR

Pektinektomie des M. pectineus

Indikation


- Junger Hund
- HD und klinische Probleme



Neurektomie

Indikation


- Ältere Hunde
- Kosten



Arthroplasie

Indikation

- Schmerzhaftes Coxarthrose
- Hunde möglichst unter 20 kg
- Gute Bemuskulung



Intertrochantäre Varisation

Indikation


- Junghunde im Alter von 4 – 10 Monaten
- Coxa valga und/oder antetorta
- Tiefes Acetabulum, Femurkopf nicht verformt
- Operation vor dem Auftreten von arthrotischen Zubildungen



Dreichfachbeckenosteotomie

Indikation

- Junge Hunde
- Loses Hüftgelenk, Subluxation
- Keine arthrotischen Veränderungen
- Flaches Acetabulum bei physiologischen Schenkelhalswinkel



Femurkopfluxationsfraktur

Luxatio ossis femoris dorsalis cranialis und
Fraktur des Caput ossis femoris rechts



Whippet, w., 5 Mo.